

# Měsíční zpráva

Počasí, voda a ovzduší v ČR

**Červen 2024**

*Mgr. Martin Laco (Oddělení operativní služby)*

*Lenka Stašová (Oddělení všeobecné klimatologie)*

*Pavel Vacík (Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň)*

*Martina Kimlová (Oddělení hydrologických předpovědí)*

*Anna Lamačová, Radek Vlnas (Oddělení podzemních vod)*

*Hana Škárová (Informační systém kvality ovzduší)*

# Obsah

<b>Červen 2024 na území ČR .....</b>	<b>2</b>
<b>1      Synoptická situace .....</b>	<b>3</b>
<b>2      Klimatologické hodnocení .....</b>	<b>3</b>
2.1    Teplota vzduchu .....	3
2.2    Srážky .....	5
2.3    Sluneční svit .....	7
<b>3      Hydrologická situace.....</b>	<b>9</b>
3.1    Povrchové vody .....	9
3.2    Podzemní vody .....	17
<b>4      Kvalita ovzduší.....</b>	<b>26</b>
4.1    Rozptylové podmínky .....	26
4.2    Suspendované částice PM <sub>10</sub> .....	28

# ČERVEN 2024 NA ÚZEMÍ ČR

Červen 2024 na území ČR byl jako celek teplotně nadnormální. První polovina měsíce byla chladnější. Ve druhé polovině měsíce se teploty držely po celou dobu nad hodnotou normálu. V tomto období jsme zaznamenali devět tropických dní. První letošní tropická noc byla dne 19. června.

Srážkově byl červen na území ČR normální. Srážkové úhrny byly prostorově velmi nerovnoměrně rozloženy. Nejvíce srážek spadlo na Moravě a ve Slezsku, kde byly srážky silně nadnormální. V Čechách spadlo srážek výrazně méně. Nejméně pak v Karlovarském kraji, kde byl srážkový úhrn podnormální. V červnu se často se vykytovaly přívalové srážky, bouřky a kroupy.

Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR  $17,9^{\circ}\text{C}$  byla o  $1,4^{\circ}\text{C}$  vyšší než normál 1991–2020. Měsíční úhrn srážek 88 mm představuje 107 % normálu 1991–2020. Průměrná délka slunečního svitu pro území ČR byla tento měsíc 218,4 hodiny, což činí 99 % normálu.

Z odtokového hlediska byl červen ve všech povodích průměrným měsícem. Relativně nejvíce vody odteklo Vltavou (113 %  $Q_{\text{VI}}$ ), Moravou (109 %  $Q_{\text{VI}}$ ) a Olší (108 %  $Q_{\text{VI}}$ ), o něco méně pak Labem a Dyjí (100 %  $Q_{\text{VI}}$ ), nejméně pak Odrou (99 %  $Q_{\text{VI}}$ ).

U většiny sledovaných toků byly průtoky na začátku měsíce nadprůměrné, postupně pak klesaly a byly průměrné nebo podprůměrné. Během června se vyskytlo několik srážkových situací, při kterých došlo k překročení SPA. Nejvyšší vodnosti byly dosaženy při srážkových situacích hned v úvodu měsíce, a to ( $Q_{10}$ ) na Litavce v Čeňkově, stejně tak v závěru měsíce na Rusavě v Chomýži a na Moštěnce v Prusech.

Stav hladiny v mělkém oběhu a vydatnost pramenů se celkově mírně zlepšil a byl normální. Hladina hlubokých vrtů se mírně zlepšila na celkově normální stav.

Z hlediska rozptylových podmínek je červen, v porovnání s 30letým průměrem 1991–2020, hodnocen jako měsíc se zlepšenými rozptylovými podmínkami. Na základě hodnocení situace s využitím indexu kvality ovzduší lze konstatovat, že kvalita ovzduší byla na měřicích stanicích během června převážně přijatelná. Červnová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací  $\text{PM}_{10}$ ,  $\text{PM}_{2,5}$  a  $\text{O}_3$  byla v roce 2024 druhá nejnižší za období 2014–2024.

**Níže uvedené údaje jsou pouze předběžné a mohou se ještě měnit, neboť data nebyla kompletně verifikována. Z důvodů procesu zpracování dat jsou do měsíčních hodnocení zahrnuta pouze neverifikovaná data z automatizovaných stanic.**

# 1 SYNOPTICKÁ SITUACE<sup>1</sup>

V červnu 2024 převažovala v prostoru Atlantik – Evropa smíšená nebo meridionální cirkulace, zonální cirkulace se vyskytla jen výjimečně. Během první červnové dekády dominovala smíšená cirkulace. Ve druhé a třetí dekádě června se častěji vyskytovala i meridionální a občas také zonální cirkulace.

Počátkem června se nad střední Evropou udržovala tlaková níže „Radha“, která se postupně přesouvala přes Polsko dále k severovýchodu. V dalších dnech se k nám rozšířil nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu až jihozápadu. Od 6. června až do konce první dekády se nad střední Evropou vlnilo frontální rozhrání oddělující teplejší vzduch na jihovýchodě od chladnejšího na severozápadě.

Na přelomu první a druhé červnové dekády se zvlněné frontální rozhraní přesunulo z Rakouska a Slovenska dále k východu a kolem tlakové níže nad Skandinávií k nám od severu až severozápadu začal proudit chladnejší vzduch. Následně počasí u nás ovlivňovala mělká brázda nízkého tlaku vzduchu, která postupovala přes střední Evropu k východu. V půlce druhé červnové dekády přes naše území přecházela studená fronta, za kterou se do střední Evropy rozšířila oblast vyššího tlaku vzduchu. V dalších dnech k nám po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou začal proudit teplý vzduch od jihozápadu. Jeho příliv ukončila studená fronta, která přes ČR přecházela 19. 6. Za ní se k nám rozšířila tlaková výše od západu.

Poslední červnová dekáda začala přechodem zvlněné studené fronty přes naše území dále k východu. Na této frontě se vyskytly velmi silně až extrémně silně bouřky s velkými kroupami. V dalších dnech se přesouvala tlaková výše ze západní Evropy přes Dánsko až nad Baltské moře. Ve druhé polovině poslední červnové dekády se střední Evropa nacházela v brázdě nižšího tlaku vzduchu. V pátek 28. června přes naše území přecházela studená fronta, za ní přes naše území postupovala oblast vyššího tlaku vzduchu a po její zadní straně k nám proudil tropický vzduch od jihu. Příliv tropického vzduchu ukončila v poslední červnový den studená fronta postupující od západu.

# 2 KLIMATOLOGICKÉ HODNOCENÍ

## 2.1 Teplota vzduchu

Červen 2024 hodnotíme jako teplotně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu za měsíc červen 17,9 °C byla o 1,4 °C vyšší než normál 1991–2020 (Obr. 2.1.1, Obr. 2.1.2). Jedná se tak o sedmý nejteplejší červen v období od roku 1961. Dosud nejteplejší červen byl v roce 2019 s průměrnou měsíční teplotou 20,7 °C. Naopak nejchladnejší červen byl v roce 1985 s průměrnou měsíční teplotou 13,0 °C.


Na území Čech byla průměrná měsíční teplota vzduchu (17,7 °C) o 0,6 °C nižší než na území Moravy a Slezska (18,3 °C).

V první polovině měsíce byla dvě období s průměrnou denní teplotou vzduchu pod hodnotou normálu. Nejvyšší záporné odchylky průměrné denní teploty vzduchu na území ČR (-4,6 °C a -4,7 °C) od normálu 1991–2020 byly zaznamenány ve dnech 12. a 13. června. Ve druhé polovině měsíce se průměrné denní teploty vzduchu držely nad hodnotou normálu. (Obr. 2.1.3).


<sup>1</sup> proudění meridionální je proudění ve směru podél poledníků, tj. od severu k jihu nebo naopak  
proudění zonální je proudění vzduchu podél rovnoběžek ve směru západ-východ  
proudění vzduchu podél rovnoběžek ve směru východ-západ se většinou označuje jako východní (negativní) zonální proudění  
<http://slovnik.cmes.cz>

Celkem v devíti dnech měsíce června byla na našem území naměřena denní maxima teploty vzduchu nad tropickými  $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Nejvyšší kladná odchylka průměrné denní teploty vzduchu na území ČR ( $7,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) od normálu 1991–2020 byla dne 29. června. V tento den vystoupila denní maxima teploty vzduchu nad  $30\text{ }^{\circ}\text{C}$  téměř na 180 stanicích standardní sítě ČHMÚ. Nejvyšší maximální denní teplotu vzduchu naměřila stanice Brod nad Dyjí dne 30. června, a to  $35,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Dosud historicky nejvyšší červnová maximální denní teplota vzduchu  $38,9\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla naměřena dne 26. 6. 2019 na stanici Doksy.


Nejnižší minimální denní teplota vzduchu  $-2,3\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla v tomto měsíci naměřena 14. června na stanici Kořenov, Jizerka. Pokud uvažujeme i stanice mimo standardní síť ČHMÚ, nejnižší minimální denní teplota vzduchu  $-3,1\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla naměřena ve stejný den na stanici Březník. Historicky nejnižší červnová minimální denní teplota vzduchu  $-8,3\text{ }^{\circ}\text{C}$  byla naměřena 1. 6. 1997 na stanici Horská Kvilda.



Obr. 2.1.1 Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR v červnu 2024



Obr. 2.1.2 Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020 na území ČR v červnu 2024



Obr. 2.1.3 Průběh průměrné denní teploty na území ČR v červnu 2024 ve srovnání s normálem 1991–2020

## 2.2 Srážky

Srážkově byl červen na území ČR normální, měsíční úhrn srážek 88 mm představuje 107 % normálu 1991–2020 (Obr. 2.2.1, Obr. 2.2.2). Srážkové úhrny byly regionálně velmi rozdílné.

V Čechách spadlo v průměru 64 mm srážek (79 % normálu) a na Moravě a ve Slezsku spadlo v průměru 135 mm srážek (162 % normálu). Nejvíce srážek v porovnání s normálem 1991–2020 spadlo v krajích


Jihomoravském (181 % normálu), Zlínském (181 % normálu), Olomouckém (180 % normálu) a Moravskoslezském (163 % normálu). Nejméně srážek v porovnání s normálem spadlo v krajích Karlovarském (67 % normálu), Středočeském (71 % normálu), Plzeňském (75 % normálu) a v kraji Vysočina (77 % normálu).

Měsíční srážkové úhrny za červen se na našem území pohybovaly v širokém rozpětí. Nejvyšší úhrn srážek za měsíc červen (275,6 mm) zaznamenala stanice Podivice (okres Vyškov). Nejvyšší úhrny srážek (přes 150 mm) byly naměřeny na stanicích na Moravě. V Čechách byly na mnoha stanicích měsíční úhrny srážek pouze do 50 mm.


Nejvyšší denní úhrn srážek v tomto měsíci (142,4 mm) zaznamenala 3. června stanice Ropice (okres Frýdek-Místek). Maximální hodinový úhrn srážek pro tento měsíc (64 mm) naměřila 21. června stanice Brno, Žabovřesky.

Letošní červen byl na srážky poměrně bohatý zejména na Moravě. Denní úhrny srážek na některých stanicích překračovaly 50 mm. Nejvíce srážek spadlo ve dnech 1., 21. a 30. června, kdy se srážky vyskytovaly téměř na celém území ČR, avšak úhrny byly velmi rozdílné.

Srážky byly často doprovázené bourkami a kroupami. Více než 10 dnů s bourkou zaznamenalo téměř 30 stanic. Nejvíce dnů s bourkou (18) měly stanice Brno, Tuřany a Prostějov. Kroupy alespoň jedenkrát v měsíci zaznamenalo více než 50 stanic. Nejvíce dnů s kroupami (3) měly stanice Brno, Žabovřesky, Sedlec a Jeseník.




Obr. 2.2.1 Měsíční úhrn srážek na území ČR v červnu 2024



Obr. 2.2.2 Měsíční úhrn srážek na území ČR v červnu 2024 v procentech normálu 1991–2020

## 2.3 Sluneční svit

Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 218,4 hodiny, což činí 99 % normálu 1991–2020 (Obr. 2.3.1). Nejvíce hodin slunečního svitu bylo v krajích Jihomoravském (236,7 h), Zlínském (232,4 h) a Vysočina (229,1 h). Naopak nejméně hodin slunečního svitu bylo v krajích Karlovarském (191,1 h), Plzeňském (199,2 h) a Libereckém (205,0 h).



Obr. 2.3.1 Měsíční úhrn doby trvání slunečního svitu na území ČR v červnu 2024

# 3 HYDROLOGICKÁ SITUACE

## 3.1 Povrchové vody

### Odtokové poměry

Z odtokového hlediska byl červen ve všech povodích průměrným měsícem. Relativně nejvíce vody odteklo Vltavou (113 %  $Q_{VI}$ ), Moravou (109 %  $Q_{VI}$ ) a Olší (108 %  $Q_{VI}$ ), o něco méně pak Labem a Dyjí (100 %  $Q_{VI}$ ), nejméně pak Odrou (99 %  $Q_{VI}$ ).; Tab. 3.1.1).

Tab. 3.1.1 Průměrné měsíční průtoky v závěrových profilech hlavních povodí, červen 2024

Tok	Profil	$Q_m$ [%]	$Q$ [ $m^3 \cdot s^{-1}$ ]
Vltava	Praha-Chuchle	113	150
Lab	Ústí nad Labem	100	230
Odra	Bohumín	99	40
Olše	Věřňovice	108	17
Morava	Strážnice	109	49
Dyje	Břeclav-Ladná	100	30

U většiny sledovaných toků byly průtoky na začátku měsíce nadprůměrné, postupně pak klesaly a byly průměrné nebo podprůměrné, (Obr. 3.1.1). Během června se vyskytlo několik srážkových situací, při kterých došlo k překročení SPA. (Obr. 3.1.2, Obr. 3.1.3). Na začátku června se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí 30 až 190 %  $Q_{VI}$ , v povodí Ohře, Otavy a Berounky byly 4 až 8násobné. Postupně hodnoty poklesly na 25–80 %  $Q_{VI}$ . V závěru měsíce opět zvýšily na od 30 do 120 %  $Q_{VI}$ , na tocích v povodí Moravy a Odry (2 až 4násobné). Celkově byly průměrné průtoky nejčastěji v rozmezí od 40 do 140 %  $Q_{VI}$ . Vodnější byly toky v povodí Otavy, Ohře a Bečvy, naopak nejméně vodné byly některé přítoky středního a dolního Labe a Dyje.

Odtok z Vltavské kaskády ve Vraném nad Vltavou se v průběhu června pohyboval od 40 do 200  $m^3 \cdot s^{-1}$ , přičemž nejvyšší hodnoty byly na začátku června.

Hned na začátku měsíce byly hladiny sledovaných toků rozkolísané. Srážky vypadávaly již na přelomu května a června, v prvních červnových dnech i velmi vydatné. Nejvíce spadlo na jihozápadě, západě a severu ČR, místy až 50 mm/24h. Hladiny toků v povodí Berounky vlivem vydatných srážek stoupaly již od 30. 5. a na několika tocích byly vlivem manipulací na nádržích dosažen 1 SPA. Během 1.–4. 6. vlivem nasycení půdy a dalším vydatným srážkám (na většině území spadlo 30 až 80 mm/72h, na severovýchodě až 160 mm/72h) reagovaly toky prudkými vzestupy, zejména v podhůří Českého lesa a Šumavy. Na Ostružné a Křemelné byl 1. 6. překročen 2. SPA. Na Úhlavě v Tajanově a na Radbuze ve Staňkově byl 1. a 2. 6. překročen 3. SPA. I na dalších tocích v povodí Berounky a horní Vltavy byl překročen 2. a 1. SPA (Obr. 3.1.4). Stoupaly také hladiny toků v povodí Odry a Bečvy, kde došlo po silných srážkách k několika případům překročení 3. SPA (Ropičanka, Bystřice), (Tab. 3.1.2, Tab. 3.1.3). U většiny toků byly vodnosti na úrovni  $Q_{<2}$ , vodnější byla Radbuza ve Staňkově, Lhotě a VD České údolí, Berounka v Bílé hoře, Lučina v Domaslavicích, Slavíč ve Slavíči, Olše v Českém Těšíně a Dětmarovicích, kde byly vodnosti  $Q_2$ , Úhlava v Tajanově a Štěnovicích a Ropičanka v Řece s  $Q_5$ , nejvodnější pak Litavka v Čeňkově s  $Q_{10}$ .


Další vzestupy hladin nastaly po srážkách 10. 6., kdy, zejména na východě ČR, spadlo až 40 mm/24h a na tocích odvodňujících Bílé Karpaty byly dosaženy 1. SPA, a to na tocích Kolelač v profilu VD Bojkovice, Olšava v profilu Uherský Brod, Vlára v profilu Popov. Na Luhačovickém potoce

v profilu Polichno byl krátce překročen i 2. SPA. K překročení 1. SPA došlo také 16. 6. na Olšavě v Uherském Brodu.


Velmi vydatné srážky vypadávaly také 21.–22. 6., kdy spadlo 20 až 70 mm/48h, v maximech až 90 mm/48h. Stanice Brno, Žabovřesky naměřila za celou bouřkovou epizodu 84,5 mm, z toho 64 mm spadlo během jedné hodiny. K překročení 1. SPA došlo na Jevíčce, Veličce ( $Q_2$ ), Hloučele, Malé Hané, Hané a Brodečce. 2. SPA byl překročen na Svitavě v Bílovicích nad Svitavou ( $Q_{<2}$ ) a 22. 6. byl překročen 3. SPA na Bělé v Boskovicích pod přehradou ( $Q_5$ ).

Poslední srážková situace s velmi silnými konvektivními bouřkami proběhla v závěru června, od 26. – 30. 6., kdy spadlo na celém území 30 až 100 mm/72 h, na severozápadě až 120 mm. Reagovaly zejména toky v povodí Odry, kdy bylo v celé řadě profilů 1. i 2. SPA, ve dvou profilech v oblasti Frýdecko-Místeka i 3. SPA (na toku Ondřejnice ( $Q_5$ ), ve stanicích Kozlovice a Rychaltice). K překročení 1. SPA došlo také v povodí Moravy a Dyje, k dosažení 2. SPA na Maršovském potoce v Hubenově pod přehradou. K překročení 3. SPA došlo na Bystřici v profilech Bystřička nad nádrží a Bystřička pod nádrží, na Velké Hané ve Vrchoslavicích a na Moštěnce v Prusech ( $Q_{10}$ , ostatní většinou při  $Q_{<2}$  až 2). Hojně bylo případů s překročením 1. a 2. SPA, a to převážně na tocích v povodí Bečvy.


Na začátku června byly vodnosti toků nejčastěji  $Q_{300-30}$ , v průběhu měsíce kolísaly a v jeho závěru byly nejčastěji v rozmezí od  $Q_{300-90}$ . Nejvyšší vodnosti byly dosaženy při srážkových situacích hned v úvodu měsíce, a to  $Q_{10}$  na Litavce v Čeňkově, stejně tak v závěru měsíce na Rusavě v Chomýži a na Moštěnce v Prusech ( $Q_{10}$ ).



Obr. 3.1.1 Průměrné měsíční průtoky na území ČR, červen 2024




Obr. 3.1.2 Průběh průtoků v červnu v závěrových profilech Vltavy a Labe



Obr. 3.1.3 Průběh průtoků v červnu v závěrových profilech Odry, Olše, Moravy a Dyje

#### Dosažené stupně povodňové aktivity

červen 2024

  
Český  
hydrometeorologický  
ústav


Obr. 3.1.4 Dosažené stupně povodňové aktivity, červen 2024

Tab. 3.1.2 Přehled průměrných, max. a min. průtoků (stavů), červen 2024

Tok	Profil	$\bar{Q}Q$	Qm	Qm	min. H	min. Q	max. H	max. Q	DD min.	DD max.	SPA
		$m^3 \cdot s^{-1}$	—	%	cm	$m^3 \cdot s^{-1}$	cm	$m^3 \cdot s^{-1}$	—	—	
Orlice	Týniště n. Orl.	8,40	11,0	76	55	4,30	131	21,0	26	2	
Labe	Přelouč	22,0	39,0	57	26	9,50	97	59,0	21	3	
Cidlina	Sány	0,82	2,40	34	7	0,11	55	3,90	21	2	
Jizera	Bakov n. Jiz.	7,20	15,0	49	119	3,80	181	20,0	30	4	
Labe	Kostelec n. L.	25,0	66,0	38	388	4,00	409	69,0	21	4	
Vltava	Vyšší Brod	12,0	13,0	89	57	5,50	112	23,0	17	15	
Malše	Roudné	5,50	8,10	68	14	1,60	96	17,0	21	2	
Vltava	České Budějovice	21,0	29,0	74	98	10,1	120	41,0	30	2	
Lužnice	Bechyně	11,0	18,0	62	79	2,30	150	25,0	13	6	
Otava	Písek	41,0	26,0	159	54	7,90	289	170	26	1	1
Sázava	Nespeky	7,70	15,0	51	37	2,90	76	14,0	28	3	
Berounka	Plzeň-Bílá Hora	36,0	15,0	238	103	7,40	362	160	26	3	2
Berounka	Beroun	59,0	31,0	189	91	11,0	286	260	25	4	1
Vltava	Praha-Chuchle	150	130	113	51	51,0	150	500	28	4	1
Ohře	Karlovy Vary	25,0	17,0	150	51	11,0	132	81,0	26	2	
Ohře	Louny	41,0	24,0	170	197	22,0	350	120	30	2	
Labe	Ústí n. Lab.	230	230	100	145	100	365	600	16	3	
Bílina	Trmice	4,40	5,00	88	95	2,70	150	13,0	28	1	
Ploučnice	Benešov nad Ploučnicí	4,30	6,30	68	-11	1,90	94	10,0	5	2	
Labe	Děčín	250	250	101	113	120	342	630	27	5	
Odra	Svinov	11,0	11,0	97	109	3,00	228	73,0	15	4	
Opava	Děhylov	14,0	13,0	112	90	5,60	135	28,0	1	20	
Ostravice	Ostrava	18,0	14,0	130	74	5,40	295	200	14	4	1
Odra	Bohumín	40,0	40,0	99	99	19,0	329	220	1	4	
Olše	Věřňovice	17,0	16,0	108	71	3,90	401	230	25	4	1
Morava	Olomouc	18,0	18,0	99	101	12,0	161	37,0	15	23	
Bečva	Dluhonice	22,0	14,0	155	37	5,40	256	110	14	4	
Morava	Strážnice	49,0	45,0	109	110	18,0	349	160	19	5	
Svatka	Židlochovice	20,0	12,0	160	65	8,90	242	78,0	14	22	
Jihlava	Ivančice	6,80	7,90	86	104	2,30	163	20,0	12	9	
Dyje	Ladná	30,0	30,0	100	16	13,0	113	69,0	22	22	

Pozn.:  $\bar{Q}Q$ ...Průměrný průtok, Qm...Dlouhodobý průměrný průtok příslušného měsíce, % Qm...Procentský měsíčního průměru H...Stav, Q...Průtok, DD...Den v měsíci, ()...Odborný odhad

Tab. 3.1.3 Přehled kulminací na tocích, kde byly v červnu 2024 dosaženy SPA nebo alespoň 2letý průtok

Tok	Stanice	Den	Čas kulminace	Stav	Průtok	Vodnost	SPA	Trvání 3. SPA	Kraj	ORP
		–	–	cm	$m^3 \cdot s^{-1}$	N-letost	–	h	–	–
Mže	VD Lučina	1	00:10	78	5.58	<2	1		P	Tachov
Mže	VD Hracholusky	1	00:10	204	49.3	<2	1		P	Nýřany
Střela	VD Žlutice	1	01:00	122	7.76	<2	1		K	Karlovy Vary
Dyje	Schwarzenau	1	11:25	188	19.3	<2	1			
Křemelná	Stodůlky	1	11:30	149	46.4	<2	2		P	Sušice
Otava	Rejštejn	1	11:50	163	89.1	<2	2		P	Sušice
Ostružná	Kolinec	1	12:00	87	13.3	<2	2		P	Sušice
Otava	Sušice	1	12:40	162	114	<2	2		P	Sušice
Otava	Katovice	1	16:50	202	150	<2	1		C	Strakonice
Otava	Strakonice	1	18:00	260	186	<2	1		C	Strakonice
Úhlava	Tajanov	1	20:30	300	49.9	5	3	1.8	P	Klatovy
Otava	Písek	1	23:30	289	173	<2	1		C	Písek
Úslava	Prádlo	1	23:30	166	9.26	<2	2		P	Nepomuk
Úhlava	Štěnovice	2	15:00	267	94.3	5	2		P	Přeštice
Úslava	Ždírec	2	15:20	150	14.9	<2	1		P	Blovice
Úslava	Koterov	2	15:50	167	61.3	<2	2		P	Plzeň
Botič	Praha - Nusle	2	17:30	121	11.4	<2	1		A	Praha
Labe	Litoměřice	2	18:00	253			1		U	Litoměřice
Litavka	Čenkov	2	21:10	138	48.4	10	2		S	Příbram
Blanice	Podedvory	2	21:40	110	12.9	<2	1		C	Prachatice
Radbuza	Staňkov	2	22:00	265	53.1	2	3	52	P	Horšovský Týn
Klabava	Hrádek	2	22:50	128	18.2	<2	1		P	Rokycany
Lužická Nisa	Proseč nad Nisou	2	23:10	80	10.2	<2	1		L	Jablonec nad Nisou
Zubřina	Domažlice	3	00:20	103		<2	1		P	Domažlice
Lužická Nisa	Liberec	3	00:40	88	9.87	<2	1		L	Liberec
Litavka	Beroun	3	00:50	171	71.4	2	1		S	Beroun
Holoubkovský potok	Rokycany - Dvořákova	3	02:10	81			1		P	Rokycany
Klabava	Nová Huť	3	12:10	157	23.6	<2	1		P	Plzeň
Radbuza	Lhota	3	14:40	306	82.2	2	2		P	Plzeň
Berounka	Bílá Hora	3	16:20	362	158	2	2		P	Plzeň
Berounka	Liblín	3	19:30	235	221	<2	1		P	Kralovice
Balinka	Baliny	3	21:30	129	9.7	<2	1			Velké meziříčí
Radbuza	VD České Údolí	3	21:40	248	73	2	2		P	Plzeň
							1			
Berounka	Zbečno	4	01:20	332	247	<2	2		S	Rakovník
Stonávka	Hradiště	4	03:20	173	15.5	<2	1		J	Velké Meziříčí
Berounka	Beroun	4	04:50	286	263	<2	1		S	Beroun
Ropičanka	Řeka	4	05:40	156	12.8	5	3	1.7	T	Třinec

Tok	Stanice	Den	Čas kulminace	Stav	Průtok	Vodnost	SPA	Trvání 3. SPA	Kraj	ORP
		—	—	cm	m <sup>3</sup> ·s <sup>-1</sup>	N-letost	—	h	—	—
Lučina	Horní Domaslavice	4	06:40	101	24.9	2	1		T	Frýdek Místek
Slavíč	Slavíč	4	06:50	143	13.3	2	1		T	Frýdek Místek
Olše	Český Těšín	4	06:50	381	198	2	2		T	Český Těšín
Bystřice	Bystřička nad nádrží	4	07:20	80	20.8	<2	3	0	Z	Vsetín
Ostravice	Frýdek-Místek tok	4	07:50	333	180	<2	1		T	Frýdek Místek
Stonávka	Hradiště	4	08:40	215	28.3	<2	2		T	Havířov
Lubina	Petřvald	4	09:40	123	55.6	<2	1		T	Kopřivnice
Morávka	Vyšní Lhoty tok	4	09:40	108	37.4	<2	1		T	Frýdek Místek
Olše	Dětmarovice	4	09:40	279	312	2	2		T	Karviná
Velká Stanovnice	Karolinka pod nádrží	4	09:40	62	3.02		1		Z	Vsetín
Ostravice	Ostrava	4	10:00	295	197	<2	1		T	Ostrava
Bystřice	Bystřička pod nádrží	4	10:00	97	11.6	<2	2		Z	Vsetín
Vltava	Praha - Chuchle	4	10:10		500.4387	<2	1		A	Praha
Olše	Věřňovice	4	11:30	401	229	<2	1		T	Bohumín
Luhačovický potok	Polichno	10	17:00	160	25.2	<2	2		Z	Luhačovice
Kolelač	VD Bojkovice	10	19:00	69,2	4.77	<2	1		Z	Uherský Brod
Olšava	Uherský Brod	10	20:50	318	54.9	<2	1		Z	Uherský Brod
Vlára	Popov	10	22:40	337, 1	46.7	2	1		Z	Valašské Klobouky
Olšava	Uherský Brod	16	12:20	283	42.3	<2	1		Z	Uherský Brod
							1			
Bělá	Boskovice pod	20	19:20	67	5.36	2	1		B	Boskovice
Lužická Nisa	Proseč nad Nisou	21	19:00	90	12.8	<2	1		L	Jablonec nad Nisou
Lužická Nisa	Liberec	21	20:30	90	10.5	<2	1		L	Liberec
Haná	Vyškov	21	21:20	91	4.9	<2	1		B	Vyškov
Jevíčka	Chornice	21	22:30	115	5.15	<2	1		E	Moravská Třebová
Velička	Hranice	22	02:30	128	15.9	2	1		M	Hranice
Haná	Vyškov	22	02:50	98	5.97	<2	1		B	Vyškov
Brodečka	Otaslavice	22	07:00	162	5.09	<2	1		M	Prostějov
Svitava	Bílovice nad Svitavou	22	10:40	272	42.4	<2	2		B	Šlapانice
Hloučela	VD Plumlov	22	13:30	56	6.08	<2	1		M	Prostějov
Bělá	Boskovice pod	22	17:20	88	8.4	5	3	2	B	Boskovice
Malá Haná	VD Opatovice	23	07:20	102	1.75	<2	1		B	Vyškov
Maršovský potok	Hubenov pod přehradou	26	08:50		4.31531	5	2		J	Jihlava
Velička	Hranice	26	20:30	126	15.4	2	1		M	Hranice
Velká Stanovnice	Karolinka pod nádrží	26	22:30	59	2.56		1		Z	Vsetín
Olešnice (Kokorka)	Kokory	27	02:20	220	4.92	<2	1		M	Přerov
Dalejský potok	Praha - Hlubočepy	27	17:30	80	3.17		1		A	Praha
Volyňka	Sudslavice	27	18:00	90	12.9	<2	1		C	Vimperk
Brodečka	Otaslavice	27	19:30	150	3.38	<2	1		M	Přerov

Tok	Stanice	Den	Čas kulminace	Stav	Průtok	Vodnost	SPA	Trvání 3. SPA	Kraj	ORP
		—	—	cm	m <sup>3</sup> ·s <sup>-1</sup>	N-letost	—	h	—	—
Loučná	Litomyšl	27	21:40	86	5.66	<2	1		E	Litomyšl
Jevíčka	Chornice	28	00:50	110	4.36	<2	1		E	Moravská Třebová
Černý potok	Velká Kraš	28	14:30	185	10.5	<2	1		M	Jeseník
Brodečka	Otaslavice	30	18:00	159	4.66	<2	1		M	Prostějov
Haná	Vyškov	30	18:20	108	7.55	<2	1		B	Vyškov
Rusava	Chomýž	30	21:10	115	14.8	10	2		Z	Bystřice pod
Juhyně	Rajnochovice	30	21:20	93	10.1	2	2		Z	Bystřice pod
Dřevnice	Kašava nad nádrží	30	21:40	143, 9	15.4	2	2		Z	Zlín
Haná	Vyškov	30	21:50	110	7.87	<2	1		B	Vyškov
Zděchovka	Zděchov	30	22:00	159	4.37	<2	2		Z	Vsetín
Hutiský potok	Solanec	30	22:30	56	3.02	<2	1		Z	Rožnov pod
Ondřejnice	Kozlovice	30	22:40	234			3	0.7	T	Frýdek-Místek
Velká Stanovnice	Karolinka pod nádrží	30	22:40	67	3.86		1		Z	Vsetín
Olešná	Palkovice	30	23:00	193	21	5	2		T	Frýdek-Místek
Litava	Brankovice	30	23:00	145	4.5	<2	1		B	Bučovice
Rožnovská Bečva	Rožnov pod Radhoštěm	30	23:10	233	101	5	2		Z	Rožnov pod
Malá Haná	VD Opatovice	30	23:10	102	1.75	<2	1		B	Vyškov
Ondřejnice	Rychaltice	30	23:20	194	43	5	3	0.2	T	Frýdek-Místek
Ropičanka	Řeka	30	23:20	100	1.93	<2	1		T	Třinec
Senice	Ústí	30	23:20	196	30.1	<2	1		Z	Vsetín
Bystřice	Bystřička nad nádrží	30	23:20	107	31.6	2	3	1.2	Z	Vsetín
Rožnovská Bečva	Horní Bečva	30	23:20	74	5.85	<2	1		Z	Rožnov pod
Lučina	Horní Domaslavice	30	23:30	91	20.6	2	1		T	Frýdek-Místek
Vsetínská Bečva	Velké Karlovice	30	23:30	202	32.3	2	2		Z	Vsetín
Bystřice	Bystřička pod nádrží	30	23:40	95	11	<2	2		Z	Vsetín
Juhyně	Kelč	30	23:40	112	18	2	1		Z	Valašské Meziříčí
Jičínka	Nový Jičín	1.7.	00:20	230	34.7	<2	2		T	Nový Jičín
Vsetínská Bečva	Vsetín	1.7.	01:20	337	168	<2	1		Z	Vsetín
Rožnovská Bečva	Valašské Meziříčí	1.7.	00:20	284	143	2	2		Z	Valašské Meziříčí
Velká Haná	Vrchoslavice	1.7.	04:00	283	29.7		3	0	M	Prostějov
Moštěnka	Prusy	1.7.	00:20	364	72.8	10	3	1.2	M	Přerov
Fryštácký potok	VD Fryšták	1.7.	00:00	107	11.5	2	2		Z	Zlín
Olše	Jablunkov	1.7.	01:10	295	76,4	2 N	1		T	Jablunkov
Lubina	Petřvald	1.7.	01:30	168	107	5 N	2		T	Kopřivnice
Velká Stanovnice	Karolinka pod nádrží	1.7.	01:30	71	4,58		1		Z	Vsetín
Vsetínská Bečva	Jarcová	1.7.	02:20	315	231	2 N	1		Z	Valašské Meziříčí
Olše	Český Těšín	1.7.	03:50	295	111	1 N	1		T	Český Těšín
Malá Haná	VD Opatovice	1.7.	05:10	108	2,51	30 M	1		B	Vyškov
Bečva	Teplice	1.7.	06:00	375	326	2 N	2		M	Hranice

Tok	Stanice	Den	Čas kulminace	Stav	Průtok	Vodnost	SPA	Trvání 3. SPA	Kraj	ORP
		–	–	cm	$m^3 \cdot s^{-1}$	N-letost	–	h	–	–
Brodečka	Otaslavice	1.7	06:00	173	6,69	1 N	1		M	Prostějov
Bělá	Boskovice pod	1.7	08:40	64	4,92	2 N	1		B	Boskovice
Morava	Spytihněv	1.7	10:00	404	302	30 M	1		Z	Otrokovice
Bečva	Dluhonice	1.7	10:30	471	301	1 N	2		M	Přerov
Morava	Kroměříž	1.7	11:40	424	302	30 M	1		Z	Kroměříž
Morava	Kroměříž	1.7	11:40	424	302	30 M	1		Z	Kroměříž

Pozn.: SPA...Stupeň povodňové aktivity, \*...ovlivněno


## Sucho na území ČR

Podíl hlásných profilů (kategorie A + B) s průtoky menšími než 25 %  $Q_{VI}$  v průběhu června kolísal mezi 4 až 10 %, nejvíce zastoupeny byly na začátku měsíce v povodí Odry (26) a na konci období v povodí horního Labe (24) a Vltavy (15), (Tab. 3.1.4).

Počet operativních hydrologických profilů s indikací hydrologického sucha ( $Q_{355d}$ ) byl v průběhu měsíce června velmi nízký a mírně se zvyšoval (v rozmezí od 0 do 30 profilů). V porovnání s loňským rokem vycházela většina června 2024 příznivěji nebo velmi podobně (Obr. 3.1.5).

Tab. 3.1.4 Procentuální vývoj počtu hlásných profilů (kategorie A + B) v hlavních povodích s průměrnými týdenními průtoky menšími než 25 %  $Q_m$ , červen 2024

Povodí	$Q < 25 \% Q_m$				
	T22 (27. 5. – 2. 6.)	T23 (3. – 9. 6.)	T24 (15. – 21. 1.)	T25 (22. – 28. 1.)	T26 (29. 1. – 4. 2.)
Horní Labe	12	4	10	16	24
Vltava	1	0	3	9	15
Dolní Labe a Ohře	0	4	0	0	0
Odra	26	7	9	7	9
Morava po Dyji	6	0	0	0	0
Dyje	0	0	0	0	0
Celkem	7	2	4	6	10



Obr. 3.1.5 Vývoj počtu operativních hydrologických profilů s indikací hydrologického sucha (Q355d), červen 2023 a 2024

## Nádrže

U většiny sledovaných nádrží byly vodní hladiny během června mírně rozkolísané. Celkové změny v zaplnění zásobních prostorů se pohybovaly nejčastěji mezi –6 až +6 %. Větší průměrné poklesy zaznamenaly vodní nádrže Pastviny (–15 %), Hněvkovice (–18 %), naopak větší průměrný vzestup byl na vodní nádrži Hracholusky (+11 %) a Skalka (+21 %).

Většina nádrží byla v průběhu června naplněna minimálně na 85 %. Méně naplněná byla nádrž Pastviny (78 %), Lipno (79 %), Hněvkovice (77 %), Orlík (73 %) a Šance (77 %).

Zásoba vody v nádržích Vltavské kaskády nad dispečerským minimem byla po celý měsíc podobná, z počátečních 38.28 mil. m<sup>3</sup> (k 3. 6.) se snížila na 37,78 mil. m<sup>3</sup> (k 1. 7.).

## 3.2 Podzemní vody

### Mělké vrtы

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v červnu na území ČR celkově normální. Normální stav převládal na většině povodí s výjimkou mírně nadnormálního stavu v povodí Horní Vltavy a Moravy a silně nadnormálního stavu v povodí Berounky (Obr. 3.2.1). Situace ve skupinách povodí III. řádu se regionálně lišila, nejhorší – mimořádně podnormální stav zde nastal v povodí Lužické Nisy a Smědé, (Obr. 3.2.2). Největší podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou byl v povodí Berounky (60 %) a Ohře a dolního Labe (28 %). Naopak vrtы se silně nebo mimořádně podnormální hladinou se nejvíce vyskytovaly v povodí Lužické Nisy (57 %) a Horního a středního Labe (16 %, Tab. 3.2.1).


Oproti předcházejícímu měsíci zaznamenala hladina mírný vzestup a zlepšení stavu. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou se zvětšil (18 %), zatímco podíl vrtů se silně nebo mimořádně podnormální (9 %) hladinou se zmenšil. Podíl vrtů s normální hladinou se téměř nezměnil

(53 %, Tab. 3.2.1). Hladina v mělkých vrtech převážně stagnovala až mírně klesala (41 %). Vzestup hladiny byl zaznamenán u 12 % a velký vzestup u 5 % vrtů. Naopak pokles hladiny nastal u 12 % vrtů a velký pokles u 2 % vrtů. K nejvýraznějšímu zlepšení stavu ze silně podnormálního na normální došlo v povodí Horní Odry a Lužické Nisy. Z normálního na silně nadnormální se stav zlepšil v povodí Berounky. Nejvíce hladina klesala v povodí Dolní Vltavy (45 % objektů) a Horního a středního Labe (38 %), naopak v povodí Horní Vltavy a Horní Odry hladina zaznamenala vzestup u 38 %, resp. 35 % vrtů (Tab. 3.2.2).

Stav hladiny v mělkých vrtech se v červnu meziročně mírně zlepšil, ale zůstal normální. Meziroční vzestup nebo velký vzestup hladiny nastal u 41 % mělkých vrtů. Nejvýrazněji se stav zlepšil v povodí Ohře a dolního Labe z mimořádně podnormálního na normální a v povodí Berounky z normálního na silně nadnormální. V povodí Berounky zaznamenala hladina vzestup nebo velký vzestup u 80 % vrtů a v povodí Ohře a dolního Labe u 67 % vrtů (Tab. 3.2.3). Ke zhoršení stavu nedošlo v žádném povodí.

#### Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech


Červen 2024



Obr. 3.2.1 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech v červnu 2024 v dílčích povodích. Vztaženo k referenčnímu období 1991–2020

**Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech**

Červen 2024



Obr. 3.2.2 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech v červnu 2024 a ve skupinách povodí III. řádu. Vztaženo k referenčnímu období 1991–2020

Tab. 3.2.1 Stav hladiny v mělkých vrtech v % počtu objektů

Povodí	Mimořádně podnormální hladina	Silně podnormální hladina	Mírně podnormální hladina	Normální hladina	Mírně nadnormální hladina	Silně nadnormální hladina	Mimořádně nadnormální hladina
Horní a střední Labe	4	12	10	62	9	3	0
Horní Vltava	2	0	5	55	14	19	5
Berounka	0	3	7	20	10	43	17
Dolní Vltava	0	0	10	75	10	0	5
Ohře a dolní Labe	3	6	11	44	8	25	3
Horní Odra	2	11	11	51	11	13	0
Lužická Nisa	14	43	14	14	0	0	14
Morava	0	3	3	62	13	16	2
Dyje	0	2	5	52	23	18	0
ČR	2	7	8	53	12	15	3

Tab. 3.2.2 Porovnání hladiny v mělkých vrtech s předchozím měsícem v % počtu objektů

Povodí	Velký pokles	Pokles	Stagnace až mírný pokles	Stagnace až mírný vzestup	Vzestup	Velký vzestup
Horní a střední Labe	5	33	51	10	1	0
Horní Vltava	0	0	19	43	19	19
Berounka	0	0	33	33	23	10
Dolní Vltava	10	35	35	0	20	0

Povodí	Velký pokles	Pokles	Stagnace až mírný pokles	Stagnace až mírný vzestup	Vzestup	Velký vzestup
Ohře a dolní Labe	0	3	53	33	11	0
Horní Odra	0	4	33	27	24	11
Lužická Nisa	0	29	43	29	0	0
Morava	0	5	46	38	10	2
Dyje	0	5	45	39	11	0
ČR	2	12	41	27	12	5

Tab. 3.2.3 Porovnání hladiny v mělkých vrtech se stejným měsícem předchozího roku v % počtu objektů


Povodí	Velký pokles	Pokles	Stagnace až mírný pokles	Stagnace až mírný vzestup	Vzestup	Velký vzestup
Horní a střední Labe	1	8	38	35	14	3
Horní Vltava	2	12	19	29	12	26
Berounka	0	3	10	7	3	77
Dolní Vltava	0	10	35	25	25	5
Ohře a dolní Labe	0	0	8	25	14	53
Horní Odra	2	4	31	20	36	7
Lužická Nisa	0	0	57	29	0	14
Morava	0	7	11	25	33	25
Dyje	0	5	30	34	25	7
ČR	1	6	25	27	20	21

## Prameny

Vydatnost pramenů byla v červnu na území ČR celkově normální. Situace se však regionálně značně lišila. V povodí Berounky byla vydatnost silně nadnormální a v povodí Horní Vltavy mírně nadnormální. Naopak v povodí Horní Odry byla zaznamenána mírně podnormální vydatnost, v povodí Lužické Nisy silně a v povodí Ohře a dolního Labe dokonce mimořádně podnormální vydatnost. Na zbylém území byla vydatnost normální (Obr. 3.2.3). Stav vydatnosti pramenů ve skupinách povodí III. řádu je zobrazen na (Obr. 3.2.4). Největší podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností byl v povodí Berounky (58 %) a Horní Vltavy (24 %). Naopak v povodí Ohře a dolního Labe a Horního a středního Labe byla zaznamenána silně nebo mimořádně podnormální vydatnost u 45 %, resp. 24 % pramenů (Tab. 3.2.4).

Oproti předcházejícímu měsíci se stav vydatnosti celkově mírně zlepšil, zůstal však normální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (18 %) se mírně zvětšil, s normální vydatností (42 %) se téměř nezměnil a se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (18 %) se mírně zmenšil (Tab. 3.2.4). Vydatnost pramenů zaznamenala stagnaci až mírné zmenšení u 48 % pramenů, ke zmenšení vydatností došlo u 9 % pramenů a k velkému zmenšení vydatnosti u 3 % pramenů. Naopak zvětšení vydatnosti nastalo u 9 % a velké zvětšení u 8 % pramenů. Ke zlepšení stavu ze silně na mírně podnormální došlo v povodí Horní Odry. V povodí Horního a středního Labe se vydatnost zlepšila z celkově mírně podnormální na normální a v povodí Horní Vltavy z normální na mírně nadnormální. V povodí Berounky a Horní Vltavy došlo u 33 % pramenů ke zvětšení vydatnosti. Naopak nejvíce se vydatnost zmenšovala v povodí Dolní Vltavy (34 % pramenů), Berounky (19 %) a Horního a středního Labe (19 %).


Stav vydatnosti se v červnu meziročně zlepšil z mírně podnormálního na normální. Meziroční zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti bylo zaznamenáno u 28 % pramenů (Tab. 3.2.6). K nejvýraznějšímu zlepšení stavu došlo v povodí Berounky z normálního na silně nadnormální. V povodí Horního a středního Labe se stav zlepšil z mírně podnormálního na normální a v povodí Horní Vltavy z normálního na mírně nadnormální. Největší podíl pramenů s meziročním zvětšením a velkým zvětšením vydatnosti byl zaznamenán v povodí Berounky (62 % pramenů) a Horní Vltavy (59 %). Naopak nejvíce se vydatnost zmenšovala v povodí Dolní Vltavy (20 % pramenů).



Obr. 3.2.3 Stav vydatnosti pramenů v červnu 2024 v dílčích povodích. Vztaženo k referenčnímu období 1991–2020

**Stav vydatnosti pramenů**

Červen 2024



Obr. 3.2.4 Stav vydatnosti pramenů v červnu 2024 a ve skupinách povodí III. řádu. Vztaženo k referenčnímu období 1991–2020.

Tab. 3.2.4 Vydatnost pramenů v % počtu objektů

Povodí	Mimořádně podnormální vydatnost	Silně podnormální vydatnost	Mírně podnormální vydatnost	Normální vydatnost	Mírně nadnormální vydatnost	Silně nadnormální vydatnost	Mimořádně nadnormální vydatnost
Horní a střední Labe	12	12	21	45	2	7	0
Horní Vltava	0	0	5	57	14	19	5
Berounka	0	10	14	14	5	29	29
Dolní Vltava	0	0	13	67	7	13	0
Ohře a dolní Labe	15	30	15	25	5	10	0
Horní Odra	5	14	23	45	5	9	0
Lužická Nisa	0	100	0	0	0	0	0
Morava	0	12	24	47	0	12	6
Dyje	0	16	16	39	16	10	3
ČR	5	13	17	42	7	13	5

Tab. 3.2.5 Porovnání vydatnosti pramenů s předchozím měsícem v % počtu objektů

Povodí	Velké zmenšení	Zmenšení	Stagnace až mírné zmenšení	Stagnace až mírné zvětšení	Zvětšení	Velké zvětšení
Horní a střední Labe	2	17	71	5	5	0
Horní Vltava	0	5	24	38	14	19
Berounka	14	5	14	33	14	19
Dolní Vltava	7	27	40	20	7	0

Ohře a dolní Labe	0	10	50	20	10	10
Horní Odra	0	5	50	32	9	5
Lužická Nisa	0	0	100	0	0	0
Morava	0	6	47	24	6	18
Dyje	0	0	58	29	10	3
ČR	3	9	48	23	9	8

Tab. 3.2.6 Porovnání vydatnosti pramenů se stejným měsícem předchozího roku v % počtu objektů

Povodí	Velké zmenšení	Zmenšení	Stagnace až mírné zmenšení	Stagnace až mírné zvětšení	Zvětšení	Velké zvětšení
Horní a střední Labe	0	14	43	19	14	10
Horní Vltava	10	5	33	19	5	29
Berounka	0	0	14	24	5	57
Dolní Vltava	13	7	33	47	0	0
Ohře a dolní Labe	0	5	25	40	10	20
Horní Odra	14	0	41	23	18	5
Lužická Nisa	0	0	0	100	0	0
Morava	6	0	29	35	6	24
Dyje	6	6	32	32	19	3
ČR	5	6	33	28	11	17

## Hluboké vrty

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech<sup>2</sup> byla v červnu mimořádně podnormální v části severočeské křídy (skupina hg rajonů 4B) a permokarbonu středních a západních Čech (8B). Silně podnormální hladina byla v části severočeské křídy (4C) a permokarbonu středních a západních Čech (8A). Mírně podnormální byla hladina v části severočeské křídy (4D), východočeské křídy (5C) a cenomanu severočeské křídy (6A). Mírně nadnormální byla hladina v části moravského terciéru (3A). Silně nadnormální byla hladina v části severočeské křídy (4A) a podkrušnohorských pánví (1A). Mimořádně nadnormální byla hladina v části cenomanu východočeské křídy (7A). Silně a mimořádně nadnormální byla stále hladina v částech cenomanu severočeské křídy (6B a 6C), které mají výrazně víceletý režim. V ostatních skupinách hg rajonů byla hladina normální. Stav části jihočeských pánví (2A) nebylo možné


<sup>2</sup> Při interpretaci výsledků je třeba brát v úvahu, že hodnocení hlubokých zvodní je prováděno na menším počtu objektů a často na kratších pozorovaných řadách, než vyhodnocování mělkých vrtů a pramenů. Většina hlubokých vrtů má sice pozorování od roku 1991, část z nich však jen od roku 2008.

zhodnotit z důvodu výpadku měření hladiny (

### Stav hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech

Červen 2024

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Obr. 3.2.5).


Oproti minulému měsíci se zlepšil stav části severočeské křídy (4A), jihočeských pánví (2C, 2D), permokarbu středních a západních Čech (8A), podkrušnohorských pánví (1A – z normálního na silně nadnormální), moravského terciéra (3A) a cenomanu severočeské křídy (6A). Zhoršil se pouze stav části východočeské křídy (5C). Snížil se zejména podíl objektů s mimořádně podnormální (10 % objektů) a normální hladinou (46 %). Naopak se zvýšil především podíl objektů se silně nadnormální hladinou (11 %), ostatní změny byly málo významné (Tab. 3.2.7).

Pokles nebo velký pokles hladiny zaznamenalo 14 % objektů. Stagnaci až mírný pokles hladiny zaznamenalo 43 % objektů. Pouze u 3 % objektů došlo k vzestupu nebo velkému vzestupu hladiny (Tab. 3.2.8).

V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zlepšil stav hladiny v celé ČR, méně se zlepšil stav v severočeské křídě a ve východních Čechách. Pokles nebo velký pokles hladiny zaznamenalo 12 % objektů, stagnaci až mírný vzestup hladiny 37 % objektů, vzestup nebo velký vzestup hladiny zaznamenalo 33 % objektů (Tab. 3.2.9).

**Stav hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech**

Červen 2024

**HGR-základní**

- |                         |                     |                     |                         |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| ■ mimořádně podnormální | ■ měrně podnormální | ■ měrně nadnormální | ■ mimořádně nadnormální |
| ■ silně podnormální     | □ normální          | ■ silně nadnormální |                         |

**HGR-cenoman**

- |                          |                      |                      |                          |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| ■■ mimořádně podnormální | ■■ měrně podnormální | ■■ měrně nadnormální | ■■ mimořádně nadnormální |
| ■■ silně podnormální     | □□ normální          | ■■ silně nadnormální |                          |

**Skupina HGR**

- |                           |                                 |                                  |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 - Podkrášnohorské pánev | 4 - Severočeská křída           | 7 - Východočeská křída - cenoman |
| 2 - Jihočeské pánev       | 5 - Východočeská křída          | 8 - Permokarbon stř. a záp. Čech |
| 3 - Morava terciér        | 6 - Severočeská křída - cenoman | 9 - Permokarbon vých. Čech       |

**Vrty**

- HGR základní ○ HGR cenoman

Obr. 3.2.5 Stav hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech v červnu 2024, vztaženo k referenčnímu období 1991–2020

Tab. 3.2.7 Stav hladiny v hlubokých vrtech v % počtu objektů

Povodí	Mimořádně podnormální hladina	Silně podnormální hladina	Měrně podnormální hladina	Normální hladina	Měrně nadnormální hladina	Silně nadnormální hladina	Mimořádně nadnormální hladina
ČR	10	10	11	46	5	11	7

Tab. 3.2.8 Porovnání hladiny v hlubokých vrtech s předchozím měsícem v % počtu objektů

Povodí	Velký pokles	Pokles	Stagnace až mírný pokles	Stagnace až mírný vzestup	Vzestup	Velký vzestup
ČR	2	12	43	38	2	1

Tab. 3.2.9 Porovnání hladiny v hlubokých vrtech se stejným měsícem předchozího roku v % počtu objektů


Povodí	Velký pokles	Pokles	Stagnace až mírný pokles	Stagnace až mírný vzestup	Vzestup	Velký vzestup
ČR	2	10	17	37	16	17

## 4 KVALITA OVZDUŠÍ

### 4.1 Rozptylové podmínky

Rozptylové podmínky byly v červnu v porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 **zlepšené** (Obr. 4.1.1). Červen 2024 byl z hlediska rozptylových podmínek sedmý nejlepší měsíc od roku 1991. Červen s nejlepšími rozptylovými podmínkami byl v roce 1994, naopak s nejhorskými v roce 2016. Dobré rozptylové podmínky, vyjádřené pomocí ventilačního indexu<sup>3</sup> pro celou ČR, byly v červnu zaznamenány ve 26 dnech. V porovnání s desetiletým průměrem se jedná o zlepšení o 4 %. Mírně nepříznivé rozptylové podmínky byly zaznamenány ve čtyřech dnech, nepříznivé pak v žádném.

V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v červnu zaznamenány výrazně horší rozptylové podmínky ve třech regionech, a to v Jihomoravském kraji včetně aglomerace Brna a ve Zlínském kraji. Zhoršené rozptylové podmínky pak byly zaznamenány ve Středočeském a Jihočeském kraji, v Olomouckém kraji. Naopak výrazně lepší rozptylové podmínky byly zaznamenány ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském Ústeckém a Libereckém kraji a zlepšené rozptylové podmínky v aglomeraci Praha. V ostatních regionech se vyskytly standardní rozptylové podmínky. Nepříznivé rozptylové podmínky se vyskytly ve všech regionech ČR. Nejvíce dobrých rozptylových podmínek (88 %) bylo zaznamenáno v Libereckém kraji, naopak nejméně (69 %) v aglomeraci Brno.



Obr. 4.1.1 Skladba rozptylových podmínek v regionech České republiky, červen 2024

<sup>3</sup> [http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/mes\\_zpravy/mesprehledy.html#ventindex](http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/mes_zpravy/mesprehledy.html#ventindex)



## 4.2 Suspendované částice PM<sub>10</sub>

### Překročení 24hod. imisního limitu PM<sub>10</sub> od počátku roku

Hodnota 24hod. imisního limitu PM<sub>10</sub> je 50 µg·m<sup>-3</sup>. Legislativa připouští na měřicí stanici nejvíce 35 překročení hodnoty imisního limitu, při vyšším počtu je imisní limit považován za překročený.

Během června došlo k překročení hodnoty imisního limitu na 1 stanici ze 108.

**24hod. imisní limit PM<sub>10</sub> nebyl do konce června překročen na žádné stanici AIM s dostatečným množstvím dat pro hodnocení** (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).

### Měsíční chod denních koncentrací PM<sub>10</sub>

Průměrné 24hod. koncentrace PM<sub>10</sub> zprůměrované pro jednotlivé typy stanic nepřekročily během června hodnotu imisního limitu (50 µg·m<sup>-3</sup>) ani doporučenou hodnotu WHO<sup>4</sup> (45 µg·m<sup>-3</sup>; Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)<sup>5</sup>.

Průměrné denní koncentrace se v průběhu celého měsíce pohybovaly pod polovinou hodnoty imisního limitu.

### Průměrné měsíční koncentrace PM<sub>10</sub>

Celorepublikový měsíční průměr koncentrací PM<sub>10</sub> byl v červnu **druhý nejnižší** za období 2014–2024 (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). V porovnání s desetiletým průměrem (2014–2023) byly průměrné koncentrace PM<sub>10</sub> o 14 % nižší.

---

<sup>4</sup> <https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329>

<sup>5</sup> Průběh koncentrací je hodnocen pouze z hlediska jeho ovlivnění meteorologickými a rozptylovými podmínkami. Meteorologické a rozptylové podmínky jsou hlavním faktorem ovlivňujícím úrovně koncentrací. Mezi další faktory patří např. množství emisí či rozložení zdrojů emisí